

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 3 - 2 - 26002878

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

(R)

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

(95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n° 70
du 23 Janvier 1986

- Après la taille, pensez à la lutte contre l'esca, l'entypiose, et excoriose.
- Les températures moyennes et les précipitations pour l'année 1985.

BSCA

..> Vous avez observé pendant cet été

- un jaunissement (cépages jaunes) ou un rougissement (cépages rouges) des feuilles entre les nervures
- un dépérissement brutal des souches.

La coupe d'un bras a mis en évidence un bois mou et spongieux

..> Il faut traiter les parcelles, avec de l'arsénite de soude (PRODALUMOL double, PYRALESCA R, RS. PYRALUMNOL) à la dose de 1250 grammes d'arsénite par hectolitre d'eau. Utiliser 3 à 500 litres de bouillie par hectare.

Intervenir pendant le **repos complet** de la végétation, une dizaine de jours après la taille, en l'absence de vent et de gel

Ces produits sont efficaces mais très toxiques:
Manipulez les avec beaucoup de précautions



Aucune nourriture ne doit être absorbée pendant les opérations de traitement.



Il est déconseillé de fumer pendant les opérations de traitement.

Imprimerie de la Station de CASAMOZZA
Directeur-Gérant: P. DUFFAUD

Abonnement Annuel: 72 F. 3
Régisseur de Recettes D.D.A.
CCP MARSEILLE 9660 74 V

Publication Périodique
CFPAP N° 1769 A-D

ISSN
0759-9623

P 30

EXCORIOSE

On peut l'observer sur les premiers entre-nœuds des rameaux : bois cassants , lésions de couleur marron en forme de boutonnière , blanchissement de l'écorce

Vous pouvez traiter

- a) En hiver avec de l'arsenite de soude : moitié de la dose destinée à l'esca, et même conditions d'emploi.
- b) Au printemps, en post-debourrement (ce traitement fera l'objet d'un autre bulletin)



blanchiment
des écorces
et formation
des pycnides

crevasses
profondes et
étranglement
à la base
des rameaux.

EUTYPIOSE

Quelques cas sont identifiés, (en BALAGNE, en CASINCA). Cette maladie reste localisée , souvent sur quelques pieds. Elle se manifeste par un dépérissement d'une partie du cep : pousses rabougries, enroulées . Une coupe du bois fait apparaître une section, dure, sèche et bien délimitée.

- **Brûlez** les souches mortes et tous les déchets de taille.
- **Désinfectez** fréquemment les outils de taille en les trempant dans l'alcool à brûler.
- **Badigeonnez ou pulvérisez** les plaies de taille avec une solution à base de Benomyl ou carbendazine à 12,5 grammes de matière active par litre d'eau.

-0-0-0--00-00-00-00-00-0-00-

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1986 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

A J A C C I O

PERIODE	TEMPERATURES		PLUVIOMETRIE en m/m	
	Moyenne	Ecart à la normale	Hauteur	Ecart à la normale
JANVIER	6,4	- 2,0	101,2	+ 26,0
FEVRIER	9,8	+ 1,0	18,0	- 54,0
MARS	9,3	- 0,8	58,2	- 2,0
AVRIL	12,7	+ 0,6	7,5	- 43,0
MAI	15,4	- 0,2	70,0	+ 26,0
JUIN	19,4	+ 0,4	3,0	- 20,0
JUILLET	23,5	+ 1,8	0,6	- 9,0
AOUT	21,7	- 0,1	0,0	- 20,0
SEPTEMBRE	20,7	+ 0,9	5,9	- 42,0
OCTOBRE	17,4	+ 1,2	21,5	- 63,0
NOVEMBRE	12,3	- 0,2	79,0	- 16,0
DECEMBRE	10,8	+ 1,1	42,0	- 43,0

B A S T I A

PERIODE	TEMPERATURES		PLUVIOMETRIE en m/m	
	Moyenne	Ecart à la normale	Hauteur	Ecart à la normale
JANVIER	6,4	-2,6	37,4	- 27,9
FEVRIER	9,2	+0,1	18,2	- 67,2
MARS	10,2	-0,3	186,0	+114,7
AVRIL	13,4	+0,7	0,6	- 59,5
MAI	16,1	0	40,9	- 2,4
JUIN	19,9	-0,1	6,8	- 26,4
JUILLET	24,2	+1,4	0,1	- 10,6
AOUT	23,5	+0,6	0,4	- 34,6
SEPTEMBRE	21,8	+1,4	47,6	- 5,5
OCTOBRE	17,6	+1,0	285,2	+186,5
NOVEMBRE	12,4	-0,5	49,9	- 43,1
DECEMBRE	11,5	+1,4	15,3	- 77,6